

## **Příbalová informace: informace pro uživatele**

### **Srivasso 18 mikrogramů prášek k inhalaci v tvrdé tobolce tiotropium**

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

#### **Co naleznete v této příbalové informaci**

1. Co je přípravek Srivasso a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Srivasso používat
3. Jak se přípravek Srivasso používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Srivasso uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### **1. Co je přípravek Srivasso a k čemu se používá**

Přípravek Srivasso pomáhá lépe dýchat lidem, kteří trpí chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). CHOPN je chronické onemocnění plic, které způsobuje dušnost a kašel. Termín CHOPN zahrnuje onemocnění chronickou bronchitidu a emfyzém. Protože je CHOPN chronické onemocnění, je třeba přípravek Srivasso používat každodenně, a nejen, když máte dýchací potíže nebo jiné příznaky CHOPN.

Přípravek Srivasso je dlouhodobě působící bronchodilatační lék, který pomáhá rozšířit dýchací cesty, a tím usnadňuje proudění vzduchu do plic a z plic. Pravidelné používání přípravku Srivasso může také pomoci v případě trvalé dušnosti, která souvisí s Vaším onemocněním, a pomůže minimalizovat dopady tohoto onemocnění na Váš každodenní život. Také Vám pomůže být déle aktivní. Každodenní používání přípravku Srivasso dále pomáhá při prevenci náhlých krátkodobých zhoršení Vašich příznaků CHOPN, které mohou trvat i několik dní.

Účinek tohoto léku přetrvává 24 hodin, což umožňuje používat jej jen jednou denně.

#### **2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Srivasso používat**

##### **Nepoužívejte přípravek Srivasso**

- jestliže jste alergický(á) na tiotropium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže jste alergický(á) na atropin nebo podobné látky, jako je ipratropium nebo oxitropium.

##### **Upozornění a opatření**

Před použitím přípravku Srivasso se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

- Poradte se se svým lékařem, jestliže máte zelený oční zákal s úzkým úhlem, máte problémy s prostatou nebo potíže s vyprazdňováním moči.
- Pokud máte problémy s ledvinami, poradte se se svým lékařem.
- Přípravek Srivasso je určen k udržovací léčbě chronické obstrukční plicní nemoci, nemá být používán k léčbě náhlých záchvatů dušnosti nebo sípotu.

- Po použití přípravku Srivasso se mohou vyskytnout časně alergické reakce jako kožní vyrážka, otok, svědění, sípot nebo dušnost. Pokud se objeví, okamžitě informujte svého lékaře.
- Inhalačně podávané léky jako Srivasso mohou ihned po inhalaci způsobit tíseň na hrudi, kašel, sípot nebo dušnost. Pokud se objeví, okamžitě informujte svého lékaře.
- Zvýšenou pozornost je třeba věnovat tomu, aby prášek z tobolek nevníkl do očí, což může vést k vyvolání nebo ke zhoršení zeleného očního zákalu s úzkým úhlem, což je oční onemocnění. Znamky akutního zeleného očního zákalu s úzkým úhlem mohou být bolest oka nebo nepříjemný pocit v oku, rozmazané vidění, vidění světelného kruhu kolem zdrojů světla nebo barevných obrazů ve spojení s červenými očima. Tyto oční příznaky mohou být doprovázeny bolestí hlavy, pocitem na zvracení nebo zvracením. Pokud se u Vás vyskytnou známky a příznaky zeleného očního zákalu s úzkým úhlem, máte užívání tiotropium-bromidu ukončit a okamžitě vyhledat pomoc lékaře, nejlépe očního specialisty.
- Sucho v ústech, které bylo pozorováno ve spojitosti s anticholinergní léčbou, může dlouhodobě přispívat ke vzniku zubního kazu. Proto, prosím, věnujte zvýšenou pozornost ústní hygieně.
- V případě, že jste prodělal(a) srdeční infarkt v posledních 6 měsících nebo se u Vás vyskytla jakákoli nestabilní nebo život ohrožující nepravidelná srdeční frekvence nebo těžké srdeční selhání během posledního roku, prosím, informujte svého lékaře. Je to důležité, aby lékař rozhodl, zda-li je přípravek Srivasso pro Vás vhodným lékem.
- Nepoužívejte přípravek Srivasso častěji než jednou denně.

### **Děti a dospívající**

Přípravek Srivasso se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let věku.

### **Další léčivé přípravky a přípravek Srivasso**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže používáte nebo jste používal(a) podobné léky k léčbě Vaší plicní nemoci, jako je ipratropium nebo oxitropium.

Nebyly hlášeny žádné specifické nežádoucí účinky při podávání přípravku Srivasso současně s jinými léky používanými při léčbě CHOPN, jako jsou úlevové inhalátory, např. salbutamol, methylxanthiny, např. theofylin, a/nebo ústy a inhalačně podávané kortikosteroidy, např. prednisolon.

### **Těhotenství a kojení**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Nepoužívejte tento přípravek, pokud Vám nebyl Vaším lékařem přímo doporučen.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Výskyt závratí, rozmazaného vidění nebo bolesti hlavy může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

### **Přípravek Srivasso obsahuje monohydrát laktózy**

Pokud je přípravek používán dle doporučeného dávkování, jedna tobolekka denně, jedna dávka obsahuje až 5,5 mg monohydrátu laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry nebo máte alergii na mléčné bílkoviny (které mohou být obsaženy v malých množstvích v pomocné látce monohydrát laktózy), poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.

## **3. Jak se přípravek Srivasso používá**

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je inhalace obsahu 1 tobolekky (18 mikrogramů tiotropia) jednou denně. Doporučenou dávku nepřekračujte.

Přípravek Srivasso se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let.

Snažte se používat tobolku každý den ve stejný čas. Je to důležité, protože Srivasso má účinnost 24 hodin.

Tobolky jsou určeny pouze k inhalaci a nikoli k podání ústy.  
Tobolky nepolykejte.

Inhalátor HandiHaler, do kterého vložíte tobolku přípravku Srivasso, tobolku proděraví a umožní vdechnutí v ní obsaženého prášku.

Ujistěte se, zda HandiHaler máte a zda ho umíte správně používat. Návod k použití inhalátoru HandiHaler je uveden na druhé straně této příbalové informace.

Ujistěte se, zda nevydechujete do inhalátoru HandiHaler.

Pokud máte s používáním inhalátoru HandiHaler nějaké problémy, požádejte lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka, aby Vám předvedl, jak inhalátor funguje.

HandiHaler jednou za měsíc vyčistěte. Návod k čištění inhalátoru HandiHaler je uveden na druhé straně této příbalové informace.

Pokud používáte přípravek Srivasso, věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby Vám prášek nevníkl do očí. Pokud se Vám nějaký prášek do očí dostane, můžete mít rozmazané vidění, bolest oka a/nebo červené oči, okamžitě si oči vymyjte teplou vodou. Pro další pomoc poté okamžitě vyhledejte lékaře.

Pokud máte pocit, že se Vaše dýchání zhoršuje, oznamte to co nejdříve svému lékaři.

#### **Jestliže jste použil(a) více přípravku Srivasso, než jste měl(a)**

Pokud inhalujete více než jednu tobolku přípravku Srivasso denně, vyhledejte okamžitě lékaře. Může u Vás být zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako je sucho v ústech, zácpa, problémy s vyprazdňováním moči, zvýšená srdeční frekvence nebo rozmazané vidění.

#### **Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Srivasso**

Jestliže jste zapomněl(a) užít svou denní dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, ale neužívejte dvě dávky současně nebo ve stejný den. Následující dávku pak užijte jako obvykle.

#### **Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Srivasso**

Před tím, než přestanete přípravek Srivasso používat, se poradte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud s používáním přípravku Srivasso přestanete, může u Vás dojít ke zhoršení známek a příznaků CHOPN.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

## **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Níže popsané nežádoucí účinky se objevily u pacientů, kteří tento lék používali. Jsou rozděleny podle četnosti výskytu na časté, méně časté, vzácné a není známo.

#### **Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):**

- sucho v ústech, které je obvykle mírné

**Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):**

- závrat'
- bolest hlavy
- poruchy chuti
- rozmazané vidění
- nepravidelný srdeční tep (fibrilace síní)
- zánět v hrdle
- chrapot
- kašel
- pálení žáhy (refluxní choroba jícnu)
- zácpa
- plísňové infekce dutiny ústní a hrdla
- vyrážka
- obtížné močení (zadržování moči)
- bolesti při močení

**Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):**

- nespavost
- vidění světelného kruhu kolem zdrojů světla nebo barevných obrazů ve spojení s červenýma očima (zelený oční zákal)
- zvýšení nitroočního tlaku
- nepravidelná srdeční frekvence (supraventrikulární tachykardie)
- zvýšená srdeční frekvence
- vnímání srdeční činnosti
- tíseň na hrudi spojená s kašlem, sípotem nebo dušností bezprostředně po inhalaci (bronchospasmus)
- krvácení z nosu
- zánět hrtanu
- zánět vedlejších nosních dutin
- střevní neprůchodnost nebo nepřítomnost střevní peristaltiky (včetně paralytického ileu)
- zánět dásní
- zánět jazyka
- obtížné polykání
- zánět úst
- pocit na zvracení
- přecitlivělost, včetně reakcí okamžité přecitlivělosti
- závažná alergická reakce, která vede k otoku obličeje a hrdla (angioedém)
- kopřivka
- svědění (pruritus)
- infekce močových cest

**Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):**

- úbytek tělesné vody (dehydratace)
- zubní kazy
- závažná alergická reakce (anafylaktická reakce)
- infekce kůže nebo kožní vředy
- suchá kůže
- otok kloubů

Závažné nežádoucí účinky zahrnují alergické reakce, které vedou k otoku obličeje nebo hrdla (angioedém) nebo k jiným reakcím přecitlivělosti (jako je náhlé snížení krevního tlaku nebo závratě). Mohou nastat samostatně nebo jako součást závažné alergické reakce (anafylaktická reakce) po podání přípravku Srivasso. Podobně jako u jiných inhalovaných léků se navíc u některých pacientů může bezprostředně po inhalaci dostavit neočekávaná tíseň na hrudi, kašel, sípot nebo dušnost (bronchospasmus). Pokud se objeví některý z těchto nežádoucích účinků, okamžitě se poraďte s lékařem.

## **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

*Státní ústav pro kontrolu léčiv*

*Šrobárova 48*

*100 41 Praha 10*

*Webové stránky: <http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek>.*

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## **5. Jak přípravek Srivasso uchovávat**

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Pokud vyjmete z blistru první tobolku, musíte po dalších 9 dnů vyjímat jednu tobolku denně ze stejného blistru.

Inhalátor HandiHaler zlikvidujte po 12 měsících od prvního použití.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## **6. Obsah balení a další informace**

### **Co přípravek Srivasso obsahuje**

- Léčivou látkou je tiotropium. Jedna tobolka obsahuje tiotropium 18 mikrogramů (jako monohydrát tiotropium-bromidu). Podaná dávka (dávka, která je uvolněna z náustku inhalátoru HandiHaler) je tiotropium 10 mikrogramů.
- Pomocnou látkou je monohydrát laktózy (který může obsahovat malá množství mléčných bílkovin).

### **Jak přípravek Srivasso vypadá a co obsahuje toto balení**

Přípravek Srivasso jsou světle zelené tvrdé tobolky obsahující prášek k inhalaci s kódem výrobku TI 01 a logem firmy vytištěným na tobolce.

*Přípravek je dostupný v následujících velikostech balení:*

Balení obsahující 30 tobolek

Balení obsahující 60 tobolek

Balení obsahující 90 tobolek

Balení obsahující 10 tobolek a 1 HandiHaler

Balení obsahující 30 tobolek a 1 HandiHaler

Nemocniční balení: Vícečetné balení obsahující 5 balení po 30 tobolečkách a inhalátor HandiHaler  
Nemocniční balení: Vícečetné balení obsahující 5 balení po 60 tobolečkách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

### **Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce**

Držitel rozhodnutí o registraci pro přípravek Srivasso je:

Boehringer Ingelheim International GmbH  
Binger Strasse 173  
D-55216 Ingelheim am Rhein  
Německo

Výrobce přípravku Srivasso a inhalátoru HandiHaler je:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  
Binger Strasse 173  
D-55216 Ingelheim am Rhein  
Německo

### **Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:**


Rakousko, Lichtenštejnsko	Srivasso 18 Microgramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation
Belgie	Srivasso – 18 mcg poudre pour inhalation en gélule
Bulharsko	Сривасо 18 микрограма прах за инхалация, твърди капсули
Kypr	Srivasso Κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο 18mcg
Česká republika	Srivasso
Dánsko	Srivasso, inhalationspulver i kapsler 18 mikrogram
Finsko	Srivasso 18 mikrog inhalaatiojauhe, kapseli, kova
Francie	Srivasso 18 microgrammes, poudre pour inhalation en gélule
Německo	Srivasso 18 Microgramm Hartkapsel mit Pulver zur Inhalation
Řecko	Srivasso Κόνις για εισπνοή, σκληρό καψάκιο INHPD.CAP 18mcg/CAP
Maďarsko	Srivasso 18 mikrogramm inhalációs por kemény kapszulában
Island	Srivasso 18 mikrógrömm, innöndunarduft, hart hylki
Velká Británie	Srivasso 18 microgram inhalation powder, hard capsule
Itálie	Srivasso 18 microgrammi, polvere per inalazione, capsula rigida
Lotyšsko	Srivasso 18 mikrogrami, inhalācijas pulveris cietās kapsulā
Litva	Srivasso 18 mikrogramų įkvėpjamieji milteliai (kietosios kapsulės)
Lucembursko	Srivasso GELULES 18 MCG
Nizozemsko	Srivasso 18 microgram, inhalatiepoeder in harde capsules
Polsko	Srivasso, 18 µg/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji w kapsułkach twardej
Portugalsko	Srivasso, PÓ PARA INALAÇÃO, CÁPSULA DURA 0,018 mg
Rumunsko	Srivasso 18 micrograme, pulbere de inhalat, capsule
Slovenská republika	Srivasso 18 mikrogramov, inhalačný prášok v tvrdej kapsule
Slovinsko	Srivasso 18 mikrogramov prašek za inhaliranje, trde kapsule
Švédsko	Srivasso, inhalationspulver, hård kapsel 18 mikrog

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.3.2021**

## HandiHaler, návod k použití:


Vážený paciente,

HandiHaler Vám umožní inhalaci léčiva obsaženého v tobolce přípravku Srivasso, který Vám lékař předepsal na Vaše dýchací potíže.




Nezapomeňte pozorně dodržovat pokyny lékaře pro používání přípravku Srivasso.

Inhalátor HandiHaler je navržen speciálně pro přípravek Srivasso. Nesmíte jej používat k aplikaci jiných léků. HandiHaler je možno používat k aplikaci léku až po dobu jednoho roku.




### HandiHaler


- 1 Horní kryt
- 2 Náustek
- 3 Spodní část
- 4 Prorážecí tlačítko
- 5 Centrální komůrka




1. Pro otevření horního krytu zmáčkněte prorážecí tlačítko v plném rozsahu a opět pusťte.




2. Odklopte úplně horní kryt povytažením směrem nahoru. Poté odklopte náustek povytažením směrem nahoru.




3. Vyměňte jednu tobolku přípravku Srivasso z blistru (jen bezprostředně před použitím, viz Manipulace s blistrem) a umístěte ji do centrální komůrky (5) tak, jak je znázorněno na obrázku. Nezáleží na tom, v jakém směru je tobolka v centrální komůrce umístěna.




4. Uzavřete pevně náustek až do jeho zaklapnutí, horní kryt ponechte odklopený.




5. Držte HandiHaler náustkem vzhůru a v plném rozsahu stiskněte pouze jednou prorážecí tlačítko směrem dovnitř, a poté jej uvolněte. Dojde k proděravění tobolky, a tím k uvolnění léku pro vdechnutí.



6. Úplně vydechněte.  
Důležité: Nikdy nevydechujte do náustku.




7. Vložte HandiHaler do úst tak, aby Vaše rty náustek pevně sevřely. Hlavu držte ve vzpřímené poloze, pomalu a hluboce se nadechněte, s dostatečnou silou tak, abyste slyšel(a) nebo cítil(a), jak tobolka uvnitř vibruje. Nadechněte se do pocitu maximálního naplnění plic, poté zadržte dech po dobu, kterou jste schopen(a) bez potíží vydržet a současně vyjměte HandiHaler z úst. Začněte opět normálně dýchat. Opakujte ještě jednou kroky 6 a 7 čímž dojde k úplnému spotřebování obsahu tobolky.




8. Znovu otevřete náustek, vyklopte použitou tobolku a vyhod'te ji. Před odložením inhalátoru HandiHaler přiklopte náustek a horní kryt.

### Čištění inhalátoru HandiHaler




HandiHaler čistěte jednou za měsíc. Odklopte horní kryt a náustek. Poté otevřete spodní část nadzvednutím prorážecího tlačítka. K odstranění zbytků prášku vypláchněte celý inhalátor teplou vodou. Pečlivě HandiHaler vysušte otřením přebytku vody papírovým ručníkem a poté dosušte na vzduchu s odklopeným horním krytem a náustkem a s otevřenou spodní částí. HandiHaler vysychá 24 hodin, proto jej čistěte ihned po použití, aby byl připraven k použití pro následující dávku. Pokud je to nutné, vnější část náustku lze čistit navlhčenou (ne mokrou) tkaninou.

### Manipulace s blistrem




A. Pomocí perforace uprostřed rozdělte blistr na dvě poloviny.





B. Pomocí volné části postupně stahujte fólii (pouze bezprostředně před použitím) do odkrytí pouze jedné tobolky. Jestliže se nedopatřením dostane další tobolka do styku se vzduchem, zlikvidujte ji.



C. Tobolku vyjměte.

Tobolky přípravku Srivasso obsahují jen malé množství prášku, proto je tobolka pouze částečně naplněna.

CE značka

Výrobce inhalátoru HandiHaler je:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG  
D-55216 Ingelheim am Rhein  
Německo