


Proč je pro pacienty s fibrilací síní důležité diskutovat o možnostech zvrácení antikoagulace?

Nedávný průzkum mezi 902 respondenty s fibrilací síní, kteří užívají antikoagulační přípravky (léky na ředění krve) ukazuje, jak důležité je, aby lékaři s pacienty hovořili o případném zvrácení antikoagulačních účinků léčby.



Pacienti užívající antikoagulační přípravky se mohou obávat negativních dopadů této léčby v akutních situacích:



89 %

respondentů ví, že antikoagulační léčba spojená s naředěním krve s sebou nese riziko možných komplikací v akutních situacích



34 %

dotázaných má obavy ohledně možných komplikací v akutní situaci



51 %

pacientů si nevybavuje, že by s lékařem hovořilo o tom, jak v případě nouze zastavit účinky léků na ředění krve

Podle pacientů s fibrilací síní je důležité s lékařem probrat možnost zvrátit protisrážlivé účinky léčby v případě nouze:



80%

pacientů tvrdí, že je pro ně (velmi) důležité si s lékařem otevřeně promluvit



83%

respondentů tvrdí, že je důležité znát léky, které v případě nouze dovedou protisrážlivý efekt medikace potlačit



78%

dotázaných by informace o možnostech potlačení negativních účinků léčby rádo slyšelo při diskuzi s lékařem

Dostatek informací dodává lidem s fibrilací síní větší jistotu pro jejich každodenní život:



64 %

dotázaných tvrdí, že by je informace o možnosti zvrátit efekt léků na ředění krve v případě nouze **uklidnila**, a o své zdraví by se pak báli méně



42 %

si myslí, že by se o ně jejich **rodina a přátelé strachovali méně**



31 %

zmiňuje, že by díky možnosti zvrátit efekt léků na ředění krve **žili aktivněji**



18 %

uvádí, že by jim možnost zvrácení účinků léků na ředění krve dodala **větší odvalu cestovat a užívat si života**



14 %

by si **hrálo se svými dětmi či vnoučaty s menšími obavami**



Boehringer
Ingelheim

O průzkumu

Zmíněný průzkum vypracovala pro společnost Boehringer Ingelheim nezávislá agentura pro marketingový výzkum Branding Science v říjnu/listopadu 2017. Výzkum byl proveden formou online dotazování mezi respondenty z řad pacientů s fibrilací síní, kterým byla předepsána léčba antikoagulanty coby prevence cévní mozkové příhody. Účelem průzkumu bylo zhodnotit postoje pacientů k léčbě antikoagulanty a případně možnosti zvrátit jejich efekt v nouzové situaci. Data vycházejí z odpovědí 902 pacientů z pěti různých zemí (USA, Rusko, Německo, Itálie a Belgie). Celkem 63 % dotázaných tvořili muži a 37 % ženy, z toho 39 % ve věkové skupině 56–70 let.